


ネコちゃん特集！ ネコちゃんも誤飲に気をつけよう！

誤飲請求件数 (2013年)



1ヶ月に約**65件**の保険金請求を受付けています！

※2013年1月～7月までのネコちゃんの誤飲に関する平均請求件数

ネコちゃんの誤飲事故も多く発生しています！

特に、ヒモ状のものに反応して追いかける習性がありますので、うっかり飲み込んでしまうことがないように、注意が必要です。ネコちゃんに与えるおもちゃや生活環境には、十分気をつけてあげましょう。



ネコちゃんの誤飲の多い年齢は0歳！


幼児期は遊んでいるうちに色々な物を食べてしまうことがあります。

ネコちゃんの届く場所に飲み込みそうな物（おもちゃや人の食べ物など）や、興味を示しそうな物（ヒモ状の物など）を置かないことが大切です。


0歳のネコちゃんは体が小さく、手術になると体への負担も大きくなりますので特に注意が必要です。

罹患率 (%)

誤飲の罹患率の年齢推移



※アニコム家庭どうぶつ白書 2012 引用



もしも誤飲をしてしまったら？

- 誤飲したヒモ状のものが口や肛門から出ていることがありますが、無理に引っ張ってはいけません。無理に引っ張ると、消化管粘膜を傷つけることになり、大変危険です。
- 食べた物によっては、死に至る危険性もあるので直ちに動物病院に相談し、指示を仰ぎましょう。



ネコちゃんの誤飲経験記



おもちゃ (ねこじゃらし) の誤飲

- 誤飲した場所 お家の中 (リビング)
- 誤飲時の年齢 1歳
- 経緯 飼い主さんが20分程度目を離したところ、ふさふさのねこじゃらしの先がなくなっていることに気づきました。変わった様子はなかったものの、誤飲を疑った飼い主さんはすぐに動物病院に連れて行きました。催吐処置を行うと、ねこじゃらしの先が大量にでてきました。

マールちゃん
2歳/女の子/混血猫
性格：内弁慶



完治までの通院・入院回数	手術の有無 / 異物摘出方法	診療費総額 (手術有りの場合、手術費含む)
通院 1回	無 / 催吐処置	1万円未満



- 予防への取り組み 人間が「食べないだろう」と判断しても、ネコちゃんの判断基準が同じとは限らないので、目の届かないところでは、おもちゃで遊ばせないように気をつけています。また、遊んだあとのおもちゃは、マールちゃんの手が届かないところにしまうように気をつけています。

アニコム獣医師からのワンポイントアドバイス

おもちゃ類はネコちゃんにとって獲物に見えているため、時として飲み込んでしまうことがあります。ネコちゃんに渡したままにしないように気をつけましょう。



ネコちゃん用ベッドのクッション部分 (布) の誤飲

- 誤飲した場所 お家の中
- 誤飲時の年齢 6歳
- 経緯 ネコちゃん用ベッドのクッション部分の布を食べてしまったことに気づいた飼い主さんは、すぐに病院に連れて行きました。特に変わった様子はなかったため、便と一緒にでてくるのを待つことになりました。数日後、嘔吐を繰り返したため入院し、退院後もしばらく通院していると、便と一緒に無事に排出されました。

チョコビちゃん
8歳/男の子/混血猫
性格：甘えん坊でさびしがり屋



完治までの通院・入院回数	手術の有無 / 異物摘出方法	診療費総額 (手術有りの場合、手術費含む)
通院5回 入院1回 半日入院14回	無 / 便と一緒に排出	30万円以上40万円以下



- 予防への取り組み チョビちゃんが食べてしまう可能性のあるものは届くところに置かないようにしています。特に留守番中は気をつけています。またベッドを食べてしまわないように、市販ではなく手作りにしました。

アニコム獣医師からのワンポイントアドバイス

布類を咬むのが好きな子は少なくありません。クッションやカーテン、じゅうたん等、ネコちゃんがかじってほつれているお宅などは特に注意が必要です。

実例 ネコちゃんの異物誤飲写真から学ぶ！

写真を提供いただいた動物病院様でのネコちゃんの誤飲の実例です。遊んでいるうちにいろいろなものを誤飲してしまうことがありますので十分注意しましょう。



さいばしの誤飲 6ヶ月/男の子/ アビシニアン



写真提供：
香川県 稲田どうぶつ病院 佐藤 昭則先生
大阪府 堀江動物医療センター 田中 利幸副院長

処 置

全身麻酔下にて、後頭部を切開。
術中CTにて、脊髄に刺さった異物の
位置を確認し、摘出

診療費総額 (手術代含む)

35万円以上40万円未満

事故の詳細

来院の直前まで元気に遊んでいましたが、急にけいれんをおこし、右半身の麻痺が起こったため来院されました。レントゲンを撮りましたが異常が見つからず、外傷も無かったため他院に画像診断を依頼したところ、さいばしの先が脊髄に刺さったことが原因で麻痺が起こっていたことがわかりました。異物の刺さりどころによっては重篤な症状が出る可能性があります。異物摘出後は、すっかり元気になりました。

ワンポイント
アドバイス!



本症例は、台所でジャンプした際にさいばしが刺さったのかもしれません。どうぶつさんには危険なものが、たくさん身の回りに潜んでいますので、ご家庭でのちょっとした努力と工夫でこのような事故を減らしていただきたいです。

(香川県 稲田どうぶつ病院 佐藤 昭則先生)

異物の誤飲は飼い主さんが気づかない間に起こっていることが多いです。特に若いネコちゃんは好奇心旺盛なので、事故が起こりやすいです。なるべく目の届かないところで遊ばせないように気をつけましょう。

(大阪府 堀江動物医療センター 田中 利幸副院長)



ゴムの誤飲 1歳/男の子/ 混血猫



写真提供：
神奈川県 かぶくん動物病院 齊田 隆幸院長

処 置

開腹手術

診療費総額 (手術代含む)

10万円以上15万円未満

事故の詳細

ネコちゃんが嘔吐を繰り返すため来院されました。吐き気止めの処置をしましたが改善しなかったためレントゲンを撮ったところ、ヒモ状の物が映っていました。開腹手術にて、とても長いゴム紐が無事に摘出されました。

ワンポイント
アドバイス!



ネコちゃんのことをとても大切に育ててくださっている優しいご家族の元でも、ネコちゃんは思いがけないいたずらをするものです。普段からネコちゃんが興味を持つものをよく把握し、飼い主さんの目の行き届かない時にいたずらされないよう気を付けましょう！

(神奈川県 かぶくん動物病院 齊田 隆幸院長)

⚠️ どうぶつさんが食べたなら危険なもののリスト

危険な物を誤飲してしまった場合は、すぐに動物病院に連絡を取り、獣医師の判断を仰ぐようにしましょう。

糸やヒモ状のもの



飲み込んだ物の太さや長さによっては、腸閉塞や腹膜炎を起こしてしまう場合があります。口や肛門から糸やヒモが出ていることがありますが、無理に引っ張ると消化管粘膜などを傷つけてしまいます。絶対に引っ張らないでください。

ヒトの医薬品



薬の種類や摂取量によって中毒症状を起こすものもあります。薬のシート等をそのまま飲み込んでしまった場合には、咽頭部や食道を傷つけ、食欲不振や嘔吐などの症状が見られることがあります。


竹串・画びょう・針

先がとがった異物は、胃や食道の粘膜を損傷させてしまう可能性が高いので、吐かせないようにしましょう。



保冷剤

保冷剤の中には「エチレングリコール」が含まれているものがあります。「エチレングリコール」の摂取は腎不全を起こしたり、中毒を起こしてしまい、大変危険です。




タバコ

タバコに含まれるニコチンが原因となる中毒症状が摂取後、数分間で起こります。興奮して活動的になり、よだれを流したり、嘔吐、下痢などが見られたりします。多量に摂取すると、震えやけいれんを起こして起立不能になり、昏睡に陥って死亡する場合があります。



靴下・タオル等の布



胃内に留まったままであったり、腸閉塞をおこしてしまうと、嘔吐、食欲不振、腹痛などの症状がみられます。布類を引きちぎって食べているとヒモ状異物と同様に大変危険です。

ボール・おもちゃ



症状は、大きさと素材により異なります。飲み込んだ物が分かっている場合は、可能であれば現物が写っている写真を動物病院に持って行きましょう。

観葉植物



観葉植物や切花の中には危険な物がたくさんあります。中毒症状を起こし、嘔吐や下痢、よだれ、食欲不振などの症状がみられることが多いようです。中には、脳や心臓、神経などに作用する中毒物質もあります。

「どうぶつ相談室サイト」では、どうぶつさんのしつけやお手入れ、健康管理をもっと知っていただくための情報を掲載しております。ぜひご活用ください。

どうぶつ相談室

検索

【発行元】アニコム損害保険株式会社 〒161-8546 東京都新宿区下落合1-5-22 アリミノビル2F

【お問い合わせ先】

あんしん
サービスセンター

0800-888-8256

携帯電話・PHSからはこちらへ **03-6810-2314**

受付時間:平日 9:30~17:30 土日・祝日 9:30~15:30

※ご利用のIP電話のご契約状況により、左記「0800」の番号にはつながらない場合があります。

※サービス向上のため、通話内容を録音させていただく場合があります。